

TK Kolonografia

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza.

Niezbędne badania dodatkowe:

Decyduje lekarz kierujący na badanie.

Badanie poziomu kreatyniny w surowicy krwi (lub GFR – współczynnik przesączania kłębkowego) jest rekomendowane przed wszystkimi badaniami techniką tomografii komputerowej wykonywanymi z podaniem kontrastu. Za aktualne wyniki uznajemy:

- a) badanie poziomu kreatyniny wykonane w okresie 7 dni poprzedzających MR u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek,
- b) badanie poziomu kreatyniny wykonane w okresie 21 dni poprzedzających MR u osób zdrowych.

Sposób przygotowania do badania:

Trzy dni przed badaniem należy zastosować dietę płynną. W tych dniach nie spożywać pestek nasion, orzechów. Dzień przed badaniem (wczesnym popołudniem) zastosować preparaty ułatwiające oczyszczenie jelita np. Fortrans (preparat dostępny jest na receptę; receptę wystawia lekarz kierujący na badanie; przed zastosowaniem preparatu FORTTRANS prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej dołączonej do preparatu). Przygotowujemy go rozpuszczając w wodzie w stosunku 1 saszetka na 1 litr. Należy wypić 4l tak przygotowanego Fortransu. Wieczorem w dniu poprzedzającym badanie należy również zastosować preparat RECTANAL - jest to roztwór do wlewów doodbytniczych oczyszczających dolny odcinek jelita grubego. (Szczegóły dotyczące sposobu użycia preparatu znajdują się w załączonej do niego ulotce).

W dniu poprzedzającym badanie i w dniu badania należy obficie przyjmować wodę niegazowaną.

W dniu badania proszę nic nie jeść, wypróżnić się przed dotarciem na badanie.

Leki:

W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi:

Pacjent powinien dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych i karty informacyjne ze szpitala.

Poinformuj lekarza o uczuleniu na środki kontrastowe, alergii i schorzeniach nerek (zwłaszcza chorzy z klirensiem kreatyniny (GFR) poniżej 30 ml/min).

Poinformuj biały personel (lekarz, pielęgniarka, technik) o ciąży.

Podczas badania:

Poinformuj o nagłych dolegliwościach.

Przeciwwskazania:

Bezwzględny przeciwwskazaniem do wykonania badania jest pierwszy trymestr ciąży. Drugi i trzeci trymestr są przeciwwskazaniem względnym - w zależności od wskazań medycznych. W razie wątpliwości pacjentka powinna we własnym zakresie wykonać test ciążowy.

Zatwierdził:
Dyrektor Departamentu Medycznego
Obowiązuje od: 11.07.2012